



## «Фитосвечи Бетулин»

«Бетулин» – препарат, активное вещество которого имеет растительное происхождение, не обладающим токсичностью и значительно улучшающим состояние пациентов, нуждающихся в адаптогенной и гепатопротекторной терапии. «Бетулин» выпускается не только в капсулах для внутреннего применения, но и в суппозиториях, оказывающих общее и местное терапевтическое действие.

В отличие от пероральной лекарственной формы активный компонент свечей не разрушается печенью – и действующее вещество поступает к органам в более концентрированном виде, что повышает эффективность такого лечения.

Бетулин в свечах – инновационная форма, не имеющая аналогов на фармацевтическом рынке РФ.

### **Состав:**

- Масло какао Бетулин 100 мг.
- Масло какао достаточное количество для получения суппозитория массой 2 г.

### **Фармакологическое действие**

Экстрагированный по специальной технологии бетулин стимулирует защитно-адаптационные реакции организма, обеспечивает местные и резорбтивные эффекты.

Местные эффекты проявляются уже после однократного применения свечей. Под действием бетулина развивается **противовоспалительный, иммуномодулирующий эффект, усиливается регенерация слизистой оболочки прямой кишки или влагалища** соответственно способу введения.

Вследствие многократного улучшения трофики создаются условия к гистологическому и функциональному восстановлению слизистых оболочек. Ректальное введение способствует уменьшению воспаления тканей **предстательной железы и облегчению болевого синдрома при мочеиспускании, улучшает кровоснабжение тканей, восстанавливает секреторные функции предстательной железы и предупреждает застой секрета.**

### **Показания:**

- для вагинального введения:
  - кольпиты и воспалительные процессы слизистой влагалища;
  - эрозивное поражение слизистой оболочки шейки матки;
  - дистрофия шейки матки;
  - эндометрит;

- комплексная терапия рецидивирующего дисбактериоза;
- послеродовые и послеоперационные осложнения: воспаления, разрывы, травмы, трещины;
- сухость и дистрофия слизистых оболочек на фоне климактерического периода.
  - для ректального введения:
- воспаление геморроидальных узлов;
- трещины, язвочки, эрозии слизистой оболочки прямой кишки;
- ускорение заживления послеоперационных ран;
- простатиты в острой и хронической формах;
- доброкачественная гипертрофия предстательной железы.
  - общие показания:
- длительный прием лекарственных средств метаболизирующихся в печени и ингибирующих активность микросомального окисления;
- период реабилитации после перенесенной острой инфекции или на фоне терапии хронических инфекционных процессов;
- поражения печени, связанные с нарушением жирового обмена и жировой дистрофии печени;
- поражения печени, связанные с употреблением алкоголя, в том числе у пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, и при острых отравлениях этиловым спиртом;
- людям, часто контактирующим с токсичными средствами на производстве.



### **Способ применения**

Вагинальное введение: 10-14 дней, после вечернего туалета и утром по 1 свече. Ректальное введение: 10-20 дней с соблюдением диеты и режима питания, вечером по 1 свече (профилактическая и симптоматическая терапия), 2-х разовое применение - утром и вечером (интенсивная терапия хронического патологического процесса). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения**

Вагинальное введение: 10-14 дней, после вечернего туалета и утром по 1 свече. Ректальное введение: 10-20 дней с соблюдением диеты и режима питания, вечером по 1 свече (профилактическая и симптоматическая терапия), 2-х разовое применение - утром и вечером (интенсивная терапия хронического патологического процесса). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Побочные действия:** препарат хорошо переносится пациентами, в единичных случаях возможно появление побочных эффектов, которые связаны с индивидуальной чувствительностью пациентов: аллергические реакции, зуд и жжение при местном применении.

### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, лактация.

### **Беременность и период лактации**

Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Перед применением бетулина в свечах требуется

проконсультироваться с врачом. В период лактации требуется временное прекращение грудного вскармливания.

**Передозировка**

При вагинальном и ректальном применении симптомы интоксикации не выявлены.

**Форма выпуска**

Фитосвечи, содержащие 100 мг бетулина, по 10 штук в полимерной банке.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре.

**Срок годности** – 36 месяцев с даты, указанной на упаковке.

**Важно:** Препарат не содержит искусственных и животных ингредиентов, ГМО и консервантов.